

FICHA TECNICA

RESIDOL PLUS I

1. DESCRIPCIÓN

Insecticida residual líquido. Es el insecticida residual más efectivo que existe en el mercado, su efecto residual permanece activo aun después de 30 días de ser aplicado. No tiene olor desagradable y no mancha.

2. FORMA DE USO O APLICACIÓN

Aplicarlo en las áreas que considere necesarias para la aniquilación de insectos. Es un producto inflamable, por lo que mientras lo está utilizando manténgase alejado de posibles fuentes de ignición.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia	Líquido fluido.
Olor	Característico (solvente).
Color	Incoloro.
Punto de inflamación	42°C
pH	5-8

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PICTOGRAMAS



Líquido y vapores inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar irritación cutánea.
Puede provocar lesiones oculares grave.
Puede ser toxico si se inhala
Puede causar somnolencia o vértigo.
Puede ser nocivo para los lactantes.
Puede ser toxico para los organismos acuáticos.
Puede ser toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

5. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los Ojos	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, conjuntivas u otras partes del ojo.
Contacto con la Piel	Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua y jabón, durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar.
Inhalación	Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno necesario, manténgala en calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Si continúan las molestias busque asistencia médica.
Ingestión	No induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.